

令和6年度 一般的な生活環境からのダイオキシン類摂取状況の推計結果 (概要)

-都民の体に取り込まれるダイオキシン類の量の推計-

都内における一般的な生活環境から人へのダイオキシン類の摂取は、主に、食物、水、大気及び土壤によるものと考えられ、ダイオキシン類の都民への健康影響について把握するため、都民が一般的な生活環境から取り込むダイオキシン類の摂取量を推計した。

令和6年度の調査結果は、下記のとおりである。

1 調査方法

(1) 食物 (水を除く。) (担当: 保健医療局健康安全部環境保健衛生課)

「令和6年度 食事由来の化学物質等摂取量推計調査」の結果のうち、飲料水を除く13食品群の結果を用いた。

(2) 水 (水道水) (担当: 水道局浄水部浄水課)

令和6年12月から令和7年1月の間、水道局が管理する13箇所の浄水場等で採水した水道水を、「水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル(改訂版)」に準拠した方法で分析し、配水量を考慮して摂取量の平均を算定した。

(3) 大気 (担当: 環境局環境改善部化学物質対策課、八王子市環境部環境保全課)

令和6年度に計4回にわたり、都内17地点で採取した大気を、「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」に準拠した方法で分析し、摂取量の平均を算定した。

(4) 土壤 (担当: 環境局環境改善部化学物質対策課、八王子市環境部環境保全課)

令和6年度に都内17地点で採取した土壤を、「ダイオキシン類に係る土壤調査測定マニュアル」に準拠した方法で分析し、摂取量の平均を算定した。

上記の方法により求められたダイオキシン類の濃度調査結果をもとに、人に取り込まれるダイオキシン類の量を推定した(WHO-2006 TEFを使用)。

2 調査結果及びまとめ (表1、表2)

今回推定したダイオキシン類の摂取量は、体重1kg当たり一日平均0.28 pg-TEQ/kg·bw/dayであった。都民の総摂取量はこれまで同様、ダイオキシン類対策特別措置法で定められている耐容一日摂取量(TDI): 4 pg-TEQ/kg·bw/dayを下回った。ダイオキシン類の総摂取量は、本調査を開始した平成11年度の調査結果2.00 pg-TEQ/kg·bw/dayの14%であった。

今後も本調査を継続して行い、都内における一般的な生活環境からのダイオキシン類の摂取状況や経年変化の状況を定期的に把握し、これらの情報を都民に提供していく。

表1 都内における一般的な生活環境からのダイオキシン類摂取状況の推定
(令和6年度)

単位 : pg - TEQ/kg·bw/day

合 計		0.28	
内 訳	食 物	0.28	(99 %)
	水	0.000047	(0.017%)
	大 気	0.0025	(0.9 %)
	土 壤	0.0012	(0.44 %)

(WHO-2006 TEFを使用)

- ・ () 内は、総摂取量に占める各経路別摂取量の割合 (%) を示す。
- ・ 有効数字2桁、四捨五入
- ・ 表の総数と内訳の計は、数値の四捨五入（小数点2位以下）のため、一致しない場合がある。

表2 一般的な生活環境からのダイオキシン類摂取状況の推移

(pg-TEQ/kg·bw/day)

	食事	割合 (%)	水	割合 (%)	大気	割合 (%)	土壌	割合 (%)	総摂取量
平成11年度	1.92	(94%)	0.00068	(0.03%)	0.068	(3.4%)	0.0094	(0.5%)	2.00
平成12年度	1.65	(96%)	0.00092	(0.05%)	0.054	(3.1%)	0.015	(0.9%)	1.72
平成13年度	1.08	(94%)	0.00047	(0.04%)	0.055	(4.8%)	0.014	(1.2%)	1.15
平成14年度	1.39	(97%)	0.00052	(0.04%)	0.031	(2.2%)	0.0080	(0.6%)	1.42
平成15年度	1.36	(98%)	0.00027	(0.02%)	0.018	(1.3%)	0.0086	(0.6%)	1.39
平成16年度	1.12	(98%)	0.00109	(0.095%)	0.020	(1.8%)	0.0056	(0.5%)	1.15
平成17年度	1.19	(98%)	0.00056	(0.05%)	0.016	(1.3%)	0.0028	(0.2%)	1.21
平成18年度	1.11	(98%)	0.00024	(0.02%)	0.015	(1.3%)	0.0027	(0.2%)	1.13
平成19年度	1.06	(99%)	0.00025	(0.02%)	0.013	(1.0%)	0.0016	(0.1%)	1.07
平成20年度	1.15	(98%)	0.00016	(0.01%)	0.012	(0.9%)	0.0044	(0.3%)	1.17
平成21年度	1.15 ^{※1}	(98%)	0.00021	(0.02%)	0.012	(0.9%)	0.0042	(0.3%)	1.17 ^{※2}
平成22年度	0.69	(98%)	0.00013	(0.02%)	0.011	(1.4%)	0.0022	(0.3%)	0.70
平成23年度	0.69 ^{※1}	(98%)	0.00015	(0.02%)	0.009	(1.1%)	0.0056	(0.7%)	0.70 ^{※2}
平成24年度	0.75	(98%)	0.00016	(0.02%)	0.0094	(1.2%)	0.0047	(0.6%)	0.76
平成25年度	0.75 ^{※1}	(98%)	0.00015	(0.02%)	0.0071	(0.9%)	0.0047	(0.6%)	0.76 ^{※2}
平成26年度	0.51	(98%)	0.00011	(0.02%)	0.0073	(1.4%)	0.0029	(0.6%)	0.52
平成27年度	0.51 ^{※1}	(98%)	0.000095	(0.02%)	0.0058	(1.1%)	0.0044	(0.8%)	0.52 ^{※2}
平成28年度	0.50	(98%)	0.000080	(0.16%)	0.0049	(1.0%)	0.0059	(1.16%)	0.51
平成29年度	0.50 ^{※1}	(98%)	0.00013	(0.026%)	0.0053	(1.0%)	0.0027	(0.53%)	0.50 ^{※2}
平成30年度	0.55	(98%)	0.000086	(0.015%)	0.0056	(1.0%)	0.0048	(0.86%)	0.56
令和元年度	0.55 ^{※1}	(98%)	0.000048	(0.0086%)	0.0052	(0.93%)	0.0050	(0.89%)	0.56 ^{※2}
令和2年度	0.40	(98%)	0.000039	(0.0096%)	0.0045	(1.1%)	0.0021	(0.52%)	0.41
令和3年度	0.40 ^{※1}	(98%)	0.000042	(0.010%)	0.0046	(1.1%)	0.0021	(0.51%)	0.41 ^{※2}
令和4年度	0.44	(99%)	0.000078	(0.018%)	0.0039	(0.9%)	0.00084	(0.19%)	0.44
令和5年度	0.44 ^{※1}	(99%)	0.000038	(0.0009%)	0.0036	(0.8%)	0.0014	(0.32%)	0.44 ^{※2}
令和6年度	0.28	(99%)	0.000047	(0.0017%)	0.0025	(0.9%)	0.0012	(0.44%)	0.28

※1:前年度のデータを使用

※2:食物のデータのみ前年度の結果を使用して試算


(WHO-2006 TEFを使用)

WHO -2006 TEF 平成 20 年 4 月 1 日に施行された現在の TEF を使用。

TEF とは測定されたダイオキシン類の量を、最も毒性の強い 2, 3, 7, 8-Tetra-CDD の毒性に換算して表す際、各異性体の濃度に乘ずる係数である。

図1 ダイオキシン類総摂取状況の推移（平成11年度～令和6年度）

(pg-TEQ/kg・bw/day)



＜用語説明＞

用語	説明
マーケットバスケット方式	様々な食品をスーパー等で購入し、必要に応じて食べる状態に加工・調理した後、分析し、各食品群ごとの化学物質等の平均含有濃度を算出する。これに、都民における食品群の平均的な消費量を乗じることにより、化学物質等の平均的な摂取量を推定する。
ダイオキシン類	ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン (PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF) 及びコプラナー-PCB (Co-PCB) の総称。
pg (ピコグラム)	1兆分の1グラム ($1\text{ g} = 10^{12}\text{ pg}$)
kg・bw/day	一日当たり体重1 kg当たりの量
TEQ (毒性等量)	毒性等価係数（ダイオキシン類の中で最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン (2,3,7,8-Tetra-CDD) の毒性を1として、他のダイオキシン類の毒性の強さを換算した係数）を用いて、ダイオキシン類の毒性を総計した値を示す単位。
耐容一日摂取量 (TDI)	ダイオキシン類など、意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりする物質に設定される。人がある物質の一定量を一生涯にわたり摂取しつづけても、健康への悪影響がないとされる一日当たりの摂取量。
WHO-2006 TEF	平成20年4月1日に施行された現在のTEF。TEFとは、測定されたダイオキシン類の量を、最も毒性の強い2,3,7,8-Tetra-CDDの毒性に換算して表す際、各異性体の濃度に乘ずる係数である。